

Диагноз: Нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей на фоне ТБСМ Т8-Т10.
Гиперактивность детрузора с ургентным недержанием мочи тяжелой степени.

Диагноз подтвержден данными уродинамического исследования.

Имеет право на получение технических средств реабилитации в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 13.02.2018 года №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».

Приказом Минтруда России от 13.02.2018 года №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации».

Рекомендовано:

1. Питьевой режим 1.5 литра в сутки
2. Уропрезервативы с пластырем/самоклеящиеся, размер 35, количество 30 штук в месяц; мочеприемник дневной, объем 750 мл с гофрированной трубкой 50 см 10 штук в месяц; мочеприемник ночной, объем 1500 мл, 10 штук в месяц; ремешки для крепления мочеприемника на ногу- 2 пары в месяц; защитная пленка в форме салфеток 30 штук в месяц; очиститель для кожи во флаконе, объем 250 мл, 1 флакон в месяц; крем защитный для обработки кожи промежности в тубе, объем 100 мл, 1 туба в месяц.
3. Везикар 10 мг 1 таб 1 раз в сутки
4. УЗИ почек, мочевого пузыря 1 раз в год
5. КУДИ 1 раз в год
6. Посев мочи на микрофлору 1 раз в год

Врач _____ -